

## MORFOLOGIA e BIOLOGÍA

O insecto adulto apresenta uma coloração pardo-avermelhado ou alaranjada sobre a que se destacam uma série de placas de cor negra.

Tem as asas transparentes e irisadas, e o bordo posterior do tórax é de cor amarela. Os ovos são achatados e de cor branca. A larva é ápoda e branca. A pupa é de forma achatada e cor amarelada que vai escurecendo à medida que progride o seu desenvolvimento.

Observam-se geralmente, de duas a três gerações anuais dependendo das condições climáticas. Passa o inverno no estado de pupa, que se localiza no solo a pouca profundidade, se bem que podem encontrar-se indivíduos em todos os estados de desenvolvimento.



© Marshall W. Johnson

Os adultos da primeira geração aparecem em março ou abril e passam certo tempo alimentando-se de substâncias açucaradas, como a melaça de alguns homópteros, até alcançar a maturação sexual e iniciar a postura. Os ovos são depositados pela fêmea debaixo da película do fruto escolhido. Este deve ter um nível de maturação adequado e não estar ocupado por outro ovo.

É típico, pois, deste insecto que deposite um só ovo por azeitona.

Após a eclosão, a larva alimenta-se do fruto escavando uma galeria pequena e tortuosa, e uma vez completado o seu desenvolvimento pupa no interior do fruto, perto da epiderme.

O nível máximo de intensidade de voo observa-se em julho e outubro, sendo mais elevado o segundo que o primeiro.



Larva de *Bactrocera oleae*

© Giancarlo Dessi

SERVIÇO DE SEGUIMENTO DE PRAGAS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS · DIFUSORES DE ATRAENTES · ARMADILHAS PARA INSETOS



### SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L.

C/ Mayor, Nº 15B · Edificio ECONEX  
Apartado de Correos Nº 167

30149 SISCAR-Santomera · Murcia (España, UE)

Tel. +34 968 86 03 82 - +34 968 86 40 88

Fax +34 968 86 23 42

Atendimento a Clientes: +34 900 502 401

[www.e-econex.com](http://www.e-econex.com) / e-mail: [econex@e-econex.com](mailto:econex@e-econex.com)



## +34 900 502 401

APROXIMAMOS O SERVIÇO AOS NOSSOS CLIENTES

Serviço em

# 48 h.

LOGITAS

DELEGAÇÃO EM PORTUGAL:

**CRIMOLARA**

**Crimolara - Produtos Químicos, S.A.**

Delegada: **María Cristina Xavier**

Campo Grande, 30 - 8º H · 1700-093 LISBOA (Portugal)

Tel. +351 217 818940 · Celular: +351 918 213386

Fax: +351 217 818969

E-mail: [cristinaxavier@crimolara.pt](mailto:cristinaxavier@crimolara.pt)

© SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX S.L., 2016



# ECONEX FOSFATO DIAMÓNICO BO KIT

Substância básica  
para captura massiva de fêmeas e machos  
da mosca da azeitona *Bactrocera oleae*

## BIOCONTROL



## DESCRIÇÃO

CÓDIGO NOME COMERCIAL

VA342 **ECONEX FOSFATO DIAMÓNICO BO KIT**

Substância básica para diluir em água em armadilha difusora de atraente, para captura massiva de fêmeas e machos da mosca da azeitona *Bactrocera oleae* + 1 suporte, com uma duração em campo de 60 dias.


Armadilha descartável em forma de garrafa com 4 orifícios para permitir a entrada dos insectos diâna, principalmente a mosca da azeitona *Bactrocera oleae*.

A armadilha inclui 20 g da substância básica fosfato diamónio com função de atraente cairomonal ou alimentício, em pó seco para diluir em água. A armadilha é composta por um suporte de arame para ser suspensa numa rama da oliveira.

NOTA: REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2016/548 DA COMISSÃO EUROPEA.

## RECOMENDAÇÕES DE USO

Tirar a tampa, juntar água até ao nível indicado na etiqueta inferior, voltar a tapar, retirar a etiqueta superior para libertar os orifícios...



...e pendurar numa rama na parte sul da árvore a uma altura de 1,5 a 2 metros.



Reabastecer se se evapora mais do que 1/3 da água. Utilizar luvas de protecção.



*Bactrocera oleae* sobre uma azeitona

## CAPTURAS MASSIVAS

De acordo com o Regulamento de Execução (UE) 2016/548 da Comissão Europeia, instalar 1 armadilha por árvore, até um máximo de 100 armadilhas por hectare. Por exemplo: para fazer capturas massivas instalam-se de 20 a 100 armadilhas por hectare, segundo a situação e homogeneidade das parcelas.

Colocar as armadilhas assim que se detectem os primeiros adultos de *Bactrocera oleae*. As armadilhas serão colocadas na face sul das oliveiras e a uma altura de 1.5 a 2 metros.

No caso de parcelas contíguas com outras que tenham um alto nível de estragos, recomenda-se reforçar os limites das mesmas colocando uma barreira de armadilhas separadas entre si de 5 a 10 metros, como se observa na imagem:



● = Armadilha ECONEX FOSFATO DIAMÓNICO BO KIT



Suporte em arame que se fornece com a armadilha

## EMBALAGEM

Comercializa-se em caixas de 35 unidades. 28 caixas por palete. Medidas: caixa 60 x 40 x 27 cm, palete 120 x 80 x 200 cm.

## ARMAZENAMENTO DO PRODUTO

O produto deve guardar-se na sua embalagem original e em lugar fresco e seco, protegido da luz, e nestas condições a sua eficácia está garantida durante 6 meses desde a data de fabrico.